

ALIN DEPOT®

Reg. Q-0895-019

**USO VETERINARIO
SUSPENSION INYECTABLE
ANTIINFLAMATORIO Y ANTIALERGICO DE
EFECTO PROLONGADO**



FÓRMULA:

Cada ml. contiene estérilmente:

21-isonicotinato de dexametasona.....5 mg.

Vehículo, c.b.p.....1 ml.

USO EN:

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN:

ALIN DEPOT® es un glucocorticoide de acción prolongada; compuesto de un éster de Dexametasona; con modificación por la acción de cloro de Isonicotinoilo de Dexametasona que forman cristales que modifican las propiedades de disolución de la Dexametasona base. No causa cambios en el efecto antiinflamatorio o antialérgico, debido a las características de disolución del 21-Isonicotinato de dexametasona en los líquidos tisulares cuando se administra por vía intramuscular. Por esta vía se determina la liberación lenta, continua, sostenida y regulada del glucocorticoide pasando a la circulación sanguínea en forma de dexametasona libre, produciendo sus efectos farmacológicos **antiinflamatorio y antialérgico**.

Los niveles efectivos de dexametasona se inician al día y medio después de su administración perdurando hasta los 14 días regulado, mediante el nivel de cortisol endógeno plasmático.

INDICACIONES:

Procesos inflamatorios como rinitis, dermatitis, traqueítis, neumonías, enfisemas y eccemas. Alergias y padecimientos musculoesqueléticos en grandes y pequeñas especies.

Intoxicaciones nutricionales y medicamentosas.

Estrés por embarques prolongados. Alergias (piel, urticaria y parásitos).

Padecimientos sistémicos como poliartritis nodosa, bursitis, tendinitis, sinovitis, dermatomiositis, esclerodermia y padecimientos asmáticos.

Choque traumático, quirúrgico y septicémico.

DOSIS TERAPÉUTICA:

Única con aplicación cada 14 días.

Bovinos, ovinos y caprinos: 5 a 20 mg. por aplicación (1 a 4 ml.)

Porcinos: 2 mg. por aplicación (0.4 ml.)

Equinos: 2.5 a 5 mg. por aplicación (0.5 a 1 ml.)

Caninos y felinos: 1 mg. por aplicación (0.2 ml.)

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

Para un efecto local puede administrarse por vía intraarticular, intrabursal, intratendinosa o intradérmica, recomendándose en los dos primeros casos sustituir 2-3 ml del fluido existente por igual cantidad de **ALIN DEPOT®**

Puede repetirse la aplicación a los 14-21 días cuando se requiera de un efecto antiinflamatorio y antialérgico prolongado o como tratamiento de mantenimiento

PERIODO DE RETIRO:

28 días en Carne

28 días en Leche

ADVERTENCIAS:

Agítese antes de cada aplicación.

La vía local deberá evitarse cuando exista infección de la articulación.

No aplicarlo en animales con infecciones asociadas por virus y hongos.

En tratamientos prolongados se puede provocar polidipsia, poliuria, aumento de peso y pérdida de potasio, en todas las especies.

No se aplique en animales con micosis sistémica.

No se aplique en hembras gestantes.

En su aplicación **ALIN DEPOT®** debe usarse agujas y jeringas estériles desechables con previa asepsia.

No aplicar al mismo tiempo con productos inmunogénicos, ya que es posible no obtener la respuesta inmunológica esperada.

Mantenga almacenado y maneje el producto fuera del alcance de los niños.

“No administrar este producto a equinos destinados para consumo humano”

PRESENTACIONES:

Frasco ampula con 6 ml.

Frasco ampula con 50 ml.

**Consulte al Médico Veterinario
Su venta requiere receta médica**

Hecho en México por:

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.

CHINOIN

Veterinaria

Lago Tangañica Núm. 18

Colonia Granada

11520, CDMX, México

Tel. 52623100

Lada sin costo 018009074900

Mayor información

Soporte Médico Veterinario

gervet@chinoin.com

www.chinoin.com