

## Antihistamínico

Reg. SAGARPA Q-7558-012

Antihistamínico no hormonal.

### FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Clorhidrato de tripelenamina 20 mg

Solución salina isotónica, c.b.p. 1 ml

### INDICACIONES:

**Bovinos:** enfisema pulmonar agudo, estados catarrales estivales, urticaria, shock anafiláctico, como estimulante en caso de depresión por indigestiones, timpanización, fiebre de leche,

alergias alimenticias, urticaria, infosura aguda, estimulante del sistema nervioso central, en casos de debilidad ocasionada por hipocalcemia posparto, fotosensibilización, hipomagnesemia, toxemia, mastitis y metritis.

**Equinos:** alergias alimenticias, estados catarrales alérgicos, urticaria, laminitris (infosura) aguda, dermatitis y fotosensibilización, shock anafiláctico, inflamaciones cutáneas por alérgenos diversos y también como estimulante en casos de depresión intensa del estado general.

**Porcinos:** enfermedad de los edemas; se prescribe simultáneamente con **Quinaflor Iny. 5 o 10%**.

**Caninos:** prurito intenso por causas indeterminadas, edema conjuntival o glosofaríngeo de origen alérgico, otitis alérgica, alergias medicamentosas y dermatitis, shock anafiláctico.

### DOSIS:

La orientativa es de 1 ml/40 kg de peso vivo; en caso necesario, repetir la dosis cada 6 a 12 horas.

Puede ser de 1 ml/20-40 kg de peso para grandes especies y de a 1 ml/45 kg de peso para pequeñas especies; el médico veterinario es quien debe decidir la dosis que se administrará.

El antihistamínico puede ser inyectado indistintamente por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa lenta; se prefiere esta última cuando se desea un efecto rápido, sobre todo cuando se busca un efecto estimulante. Como norma general, es preferible empezar con una dosis media o baja, y si después de una hora no se consiguió el efecto deseado, se repite la inyección, aumentando en un 25%, hasta haber dominado la causa del proceso.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular, subcutánea o intravenosa.

**PRESENTACIÓN:** Frascos de vidrio de 20 y 100 ml.

### ADVERTENCIAS:

- Cuando se administra por vía intravenosa, debe calentarse el producto a la temperatura del cuerpo e inyectar lentamente.
- No usar el producto días antes del sacrificio de los bovinos y porcinos.
- No usar para consumo humano la leche de animales tratados con este producto hasta 24 horas después de la aplicación.
- No administrar en equinos destinados para consumo humano.

