

DYSCURAL PVE®

Reg. Q-0895-053

**USO VETERINARIO
SOLUCIÓN INYECTABLE
ANTIDIARREICO Y ANTIMICROBIANO DE AMPLIO
ESPECTRO**



FÓRMULA:

Cada ml. contiene:

Clorhidrato de Bencetimida equivalente a.....0.300 mg.

de Bencetimida base

Sulfato de Gentamicina equivalente a.....20 mg.

de Gentamicina base

Vehículo, c.b.p.....1 ml.

USO EN:

Perros y gatos

INDICACIONES:

Para el tratamiento de la diarrea y la hipersecreción.

Diarreas infecciosas de origen bacteriano	Diarreas de origen Mecánico	Coadyuvante en diarreas de origen viral, parasitario y micótico
<i>Salmonella spp</i> <i>Escherichia spp.</i> <i>C. perfringens</i>	Estrés	Rotavirus Coronavirus + Parvovirus Astrovirus
	(Dietaria) Cambios bruscos en la alimentación Alergia al alimento	<i>Dipylidium caninum</i> <i>Toxocara canis</i> <i>Toxocara cati</i> <i>Trichuris vulpis</i> <i>Ancylostoma caninum</i> <i>Coccidias</i> <i>Giardiasis</i> <i>Toxoplasma</i>
	Manejo inadecuado	Histoplasmosis, aspergilosis y <i>Candida spp.</i>

DOSIS:

1 ml por cada 5Kg de peso cada 24 hrs. durante 2 días

MECANISMO DE ACCIÓN DE DYSCURAL PVE®

- La bencetimida CHINOIN actúa en el sistema nervioso parasimpático, bloqueando algunos receptores de acetil colina, modulando de esta manera el movimiento peristáltico y la segmentación, además de disminuir la hipersecreción de líquidos a la luz intestinal, lo que evita el llenado del intestino y de esa manera el deseo de la

defecación, permitiendo que los nutrientes y el agua tengan contacto con las paredes del intestino y puedan ser adsorbidos.

- **La gentamicina** es un aminoglucósido que actúa sobre las unidades ribosomales 30s de las Bacterias Gram negativas, alterando la función del RNA mensajero y, por lo tanto, inhibiendo la síntesis de proteínas. Además, altera la membrana celular bacteriana, fijándose en los receptores de superficie (cargas iónicas), provocando con esta unión el trastorno de permeabilidad de membrana.

Sistema Nervioso Autónomo		
Actividad		
Órgano inervado	Simpático	Parasimpático
Tubo digestivo		
Motilidad y Tono	Inhibición	Estimulación
Esfínteres	Contracción	Relajación
Secreción	Puede inhibirlas	Estimula
Vesícula y conducto Biliar	Inhibición	Estimulación
Hígado	Glucogenólisis	-----
Bazo	Contracción	-----

ADVERTENCIAS:

No debe ser administrado con otros anticolinérgicos.

No debe aplicarse cuando el animal presente hipoperistaltismo o tenesmo.

No debe administrarse por periodos mayores de 48 horas.

En caso de sobredosificación utilizar pilocarpina o su equivalente.

Mantenga almacenado y maneje el producto fuera del alcance de los niños.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda o Subcutánea.

PRESENTACIÓN: Frasco ampula con 20 ml

Hecho en México por:

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.

Lago Tangañica Núm. 18

Colonia Granada

11520, CDMX, México

Tel. 52623100

Lada sin costo 018009074900

Mayor información

Soporte Médico Veterinario

gervet@chinoin.com

www.chinoin.com