

KirOftal Diclo

LÍNEA OFTÁLMICA

Solución oftálmica
Diclofenaco sódico
Antiinflamatorio no esteroidal

NUMERO DE REGISTRO Q-0790-012

FÓRMULA

Diclofenaco sódico.....1mg
Vehículo c.b.p.....1 ml

PRESENTACIÓN

Frasco gotero 12 ml.



INDICACIONES

Actúa como analgésico y antiinflamatorio de la región ocular ocasionada por cirugía del ojo o de sus tejidos anexos. Coadyuvante en conjuntivitis infecciosa, queratitis, queratoconjuntivitis, blefarokeratitis.

MECANISMO DE ACCIÓN

El diclofenaco sódico es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), con actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Tiene propiedades de ácido débil y su solubilidad depende del pH, actúa a nivel del metabolismo del ácido araquidónico mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, responsable de la síntesis de prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos mediadores de la inflamación.

La solución tópica de diclofenaco de sodio reduce la inflamación después de la extracción de cataratas y contrarresta fotofobia en la cirugía refractiva corneal. En medicina veterinaria, el diclofenaco sódico se utiliza para el tratamiento de la uveítis posterior a la cirugía en el ojo u otras causas de uveítis especialmente cuando se sospecha de infección corneal o en pacientes diabéticos cuya regulación de la insulina podría ser alterado por la absorción sistémica de los corticosteroides tópicos. KirOftal Diclo puede combinarse con corticosteroides tópicos para un mejor control de la uveítis en animales cuando la condición es grave.

El diclofenaco actúa sobre la vía de la lipooxigenasa disminuye los signos de la inflamación ocular después de la extracción de cataratas. Este fármaco puede prevenir los efectos de las prostaglandinas en las estructuras del ojo. La eliminación resultó rápida y casi completa al cabo de 6 horas. No se detectan concentraciones plasmáticas de diclofenaco después de su aplicación ocular.

ADVERTENCIAS Y/O RESTRICCIONES

En caso de signos de irritación o alergia suspenda su uso de inmediato. Conserve en un lugar seco, fresco a no más de 30°C y protegido de la luz solar directa y en su envase original. No se deje al alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.



KirOftal Diclo

LÍNEA OFTÁLMICA

ESPECIES

Caninos y Felinos

DOSIS

Aplique 2 gotas en el ojo afectado, 3 a 4 veces al día dependiendo de la severidad del caso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oftálmica.

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA**CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO**

Literatura exclusiva para Médicos veterinarios. No se deje al alcance de los niños.

Responsables de contenido: Departamento Técnico. farmacovigilancia@kironmexico.com

LABORATORIOS KIRÓN MÉXICO S.A. de C.V.

Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 582 Col. Benito Juárez Cd. Nezahualcóyotl

Estado de México. C.P. 57000 TEL.55 51 12 77 43

Sitio Web: www.kironmexico.com

También encuéntranos en Facebook, Instagram, You Tube y LinkedIn