

LagriVet SC

LÍNEA OFTÁLMICA

Solución Humectante
 Sulfato de Condroitina
 Cloruro de Sodio
 Sustituto Lagrimal

NUMERO DE REGISTRO Q-0790-135

FÓRMULA

Sulfato de Condroitina.....200 mg

Cloruro de sodio.....9 mg

Excipientes c.b.p.....1 ml



PRESENTACIÓN

Frasco gotero con 10 ml.

DESCRIPCIÓN

LAGRIVET SC Es una solución humectante, sustituto lagrimal con Condroitín Sulfato al 20%.

INDICACIONES

Indicado para el alivio temporal de resequead debido a queratoconjuntivitis sicca, blefaroconjuntivitis, queratitis por exposición, blefaritis, indicado también como coadyuvante de cualquier tratamiento tópico ocular para restablecer la calidad de la película lagrimal precorneal y recuperar su fisiología.

MECANISMO DE ACCIÓN

El condroitín sulfato es un glucosaminoglucano asociado a proteínas (proteoglicanos) es de gran peso molecular y puede estar constituida por más de 100 azúcares, se encuentra en la mayoría de los tejido de vertebrados e invertebrados y está presente principalmente en aquellos que poseen una gran matriz extracelular como parte de los tejidos conectivos de cuerpo (piel, cartílago, vasos sanguíneos, ligamentos y tendones) posee la característica de formar soluciones de alta viscosidad y baja opalencia por lo que se emplea como agente viscosante y humectante en formulaciones oftálmicas, también, **tiene actividad antiinflamatoria al inhibir las enzimas y proteolíticas contenidas en las lágrimas, en procesos inflamatorios o son producidas por numerosas bacterias, como *Pseudomonas aeruginosa* (hialuronidasa y proteasas séricas, así como la plasmina),** favorece el crecimiento celular y cicatrización de úlceras, promueve la producción de fibronectina. Elimina la sequedad ocular, es un humectante y regenerador del epitelio corneal por su capacidad de fijar y retener agua mejorando la calidad de la lágrima, favorece la regeneración del epitelio. Se le puede emplear para la remoción de lagañas y costras, arrastre mecánico de cuerpos extraños o sustancias irritantes, previo al empleo del colirios o ungüentos para el tratamiento de producción de lagrima (ciclosporina, tacrolimus)

LagriVet SC

LÍNEA OFTÁLMICA

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

El condroitín sulfato no tienen capacidad de penetración intraocular; sin embargo, aumentan el tiempo de permanencia de la película lagrimal precorneal. El condroitín sulfato es transportado por el plasma y se elimina rápidamente de la circulación sistémica.

ADVERTENCIAS Y/O RESTRICCIONES

Suspender su uso en caso de presentar sensibilidad a la fórmula. Conserve en un lugar fresco, seco a no más de 30°C y protegido de la luz solar directa. No se deje al alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El condroitín sulfato aumenta la biodisponibilidad de medicamentos oftálmicos (por ejemplo, antibióticos) cuando se aplican de forma concomitante.

ESPECIES

Caninos y felinos

DOSIS

Aplicar 1 o 2 gotas en el fondo de saco del ojo afectado cada 4-6 horas, tan frecuentemente como se requiera o a criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oftálmica exclusivamente.

SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Literatura exclusiva para Médicos veterinarios. No se deje al alcance de los niños.

Responsables de contenido: Departamento Técnico. farmacovigilancia@kironmexico.com

LABORATORIOS KIRÓN MÉXICO S.A. de C.V.

Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 582 Col. Benito Juárez Cd. Nezahualcóyotl

Estado de México. C.P. 57000 TEL.55 51 12 77 43

Sitio Web: www.kironmexico.com

También encuéntranos en Facebook, Instagram, You Tube y LinkedIn