

MEGLUMINE®

Analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esterooidal inyectable.

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-1069-093

FÓRMULA

Cada ml contiene:

Flunixin meglumina..... 83.0 mg

(equivalente a 50 mg de flunixin base)

Vehículo c.b.p..... 1.0 ml

PRESENTACIÓN

Frascos con 20, 50 y 100 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular o intravenosa.



DOSIS

Bovinos: de 1 a 2 ml por cada 45 kg de peso corporal, cada 24 horas por no más de 5 días.

Equinos: de 1 a 2 ml por cada 45 kg de peso corporal, cada 24 horas por no más de 4 días.

Porcinos, caprinos y ovinos: 2 ml por cada 45 kg de peso corporal, cada 24 horas.

Caninos y felinos: 1 ml por cada 45 kg de peso corporal.

La modificación de la dosis queda a criterio del Médico Veterinario Zootecnista.

ESPECIES

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

PROPIEDADES

MEGLUMINE está indicado para el tratamiento de la inflamación y el dolor asociado a padecimientos respiratorios, septicemias, metritis, cólico, alteraciones del músculo esquelético que pueden presentarse en bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos. Es el analgésico más potente usado en equinos, principalmente para cólicos.

ADVERTENCIAS

No consumir la leche de animales tratados hasta 12 horas después de su última aplicación. No consumir la carne de animales tratados hasta 24 horas después del último tratamiento.

En porcinos, no usar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

RECOMENDACIONES

Para su aplicación utilice material totalmente estéril y nuevo.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

No se exponga a la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

