



FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® INTRA-TRAC ORAL Bb

Reg. SAGARPA B-0273-291

USO VETERINARIO

1

VACUNA LIOFILIZADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA CAUSADA POR *Bordetella bronchiseptica*.

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Bordetella bronchiseptica, cepa B-C2

$\geq 1 \times 10^9$ UFC

Vehículo c.b.p.

1 dosis

DESCRIPCIÓN:

Nobivac® Intra-Trac Oral Bb es una vacuna para administración oral, contiene cultivo vivo avirulento de *Bordetella bronchiseptica*. La vacuna se presenta en forma liofilizada junto con diluyente estéril.

INDICACIONES:

Para la vacunación de cachorros y perros adultos sanos como ayuda en la prevención de la traqueobronquitis infecciosa canina ("tos de las perreras") causada por *Bordetella bronchiseptica*.

ESPECIES DESTINO:

Caninos.

FORMA FARMACÉUTICA:

Pastilla liofilizada.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 1 ml por vía oral.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

Vacunar cachorros sanos de 7 semanas de edad o mayores.

Revacunación:

Se recomienda la revacunación anual.

Preparación de la vacuna:

Reconstituir asépticamente la vacuna deshidratada con el diluyente estéril proporcionado. Retirar la aguja y administrar 1 ml por vía oral en la cavidad bucal. Utilizar inmediatamente después de la rehidratación.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Sólo deberán vacunarse animales sanos y desparasitados.
- Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.



CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede producir anafilaxis y/u otras reacciones inflamatorias de hipersensibilidad inmunomediadas. Administrar epinefrina, corticosteroides, y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

No se ha establecido la seguridad del producto durante la gestación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

No hay signos diferentes a los de una sola dosis.

Incompatibilidades:

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario excepto Nobivac[®] solvente.

Precauciones de Almacenamiento:

Conservar en refrigeración de 2°C a 8°C.

No congelar.

Nobivac[®] Diluyente puede conservarse a temperatura ambiente.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRESENTACIONES:

Caja con 25 frascos de una dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International, B.V.

Wim de Körverstraat 35,
5830 AA, Boxmeer,
Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.