

# Ophthavet®

Reg. Q-0895-107

## FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Clorhidrato de Ciprofloxacino  
monohidratado equivalente a .....3.0 mg  
de Ciprofloxacino  
Vehículo cbp .....1.0 ml



**USO EN:** Caninos y Felinos.

**MECANISMO DE ACCIÓN:** El Ciprofloxacino es un antibiótico de la familia de las quinolonas, el cual actúa inhibiendo la enzima DNA girasa, enzima necesaria para separar el DNA replicado, inhibiendo la división celular. OPTHAVET tiene amplio espectro, actúa sobre agentes patógenos grampositivos (*Bacillus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus haemolyticus*, *Staphylococcus epidermidis*) y gramnegativos (*Acinetobacter calcoaceticus*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*).

## INDICACIONES:

OPHTAVET está indicado para el tratamiento de infecciones del globo ocular de perros y gatos, los cuales cursan con conjuntivitis bacteriana, queratitis ulcerativas u otros problemas de superficie ocular causadas por microorganismos Gram+ y Gram- susceptibles. También se utiliza durante el previo y postquirúrgico del ojo.

## DOSIS:

- Conjuntivitis bacteriana: aplicar 1 gota en el ojo afectado cada 6 u 8 horas de 7 a 15 días dependiendo el padecimiento.
- Úlceras corneales estromales profundas: aplicar 1 gota cada 2 horas por un periodo de 24 a 48 horas (a criterio del M.V.Z.) después se puede mantener una frecuencia de 1 gota cada 6 u 8 horas de 15 a 21 días.
- Úlceras colagenolíticas o altamente contaminadas: aplicar 1 gota en el ojo afectado cada 15 minutos por 2 ó 6 horas. Para continuar con 1 gota cada 2 horas por un periodo de 24 a 72 horas y posteriormente mantener la frecuencia cada 6 horas de 8 a 21 días según la gravedad del caso.
- Para otros padecimientos involucrados con infecciones de leves a moderadas el goteo se recomienda cada 8 o cada 12 horas por 7 días aproximadamente.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oftálmica.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

## ADVERTENCIAS:

El uso del producto por tiempo prolongado de más de 4 semanas puede producir toxicidad sobre el epitelio corneal o retrasar la cicatrización.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.  
No se deje al alcance de los niños.

Su venta requiere receta médica.  
Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.  
Consulte al Médico Veterinario.

**PRESENTACIÓN:** Frasco gotero con 5 mL.

Hecho en México por:  
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, S.A. DE C.V.  
Lago Tangañica Núm.18  
Col. Granada  
11520 Ciudad de México  
Tels. 55 52623100  
Lada sin costo 800 907 49 00  
Mayor información:  
gervet@chinoin.com.mx  
www.chinoin.com