

# SCABISIN®

Reg, RSCO-PEC-INAC-0156-346-008-005

## USO VETERINARIO

Permetrina al 1 %

SUSPENSIÓN TÓPICA INSECTICIDA Y/O ACARICIDA

## FÓRMULA:

Cada 100 ml. contienen:

Composición porcentual:

|                                                                                                                    | equivalente |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|                                                                                                                    | %           | g / l |
| 3- (Fenoxifenil) metil (+-) cis, trans-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.....             | 5.0         | 56.3. |
| Butóxido de Píperonilo.....                                                                                        | 0.3         |       |
| Acetato de Prednisolona.....                                                                                       | 0.1         |       |
| Viscosantes, conservadores, dispersante, tensoactivo, aromatizantes, antiespumante, solubilizante y vehículo ..... | 94.6        |       |

## USO EN:

Caninos y Conejos.

## DESCRIPCIÓN:

Suspensión tópica de acción antiinflamatoria y ectoparasitocida que se aplica directamente sobre las lesiones ocasionadas por los parásitos externos y el autotrauma causado por el rascado

## "INSTRUCCIONES DE USO"

**SCABISIN®** suspensión se utiliza para perros y conejos en el control y eliminación de los siguientes acáridos:

**Perros:** *Sarcoptes scabiei*, *Cheyletiella yasguri*, *Otodectes cynotis*, **Conejos:** *Psoroptes cuniculi*, *Sarcoptes scabiei*, *Cheyletiella parasitivorax*.

Coadyuvante en el tratamiento de la sarna por ***Demodex spp.***

## Dosis:

Una sola aplicación es efectiva, sin embargo una segunda o tercera aplicación cada 7 días son recomendadas para el control de las reinfestaciones de los ácaros con la presencia de nuevas lesiones.

Serán justificadas más aplicaciones si existe el diagnóstico confirmativo parasitológico del ácaro activo.

**VÍA DE ADMINISTRACION:** Tópico, uso externo.



**Método para aplicar el producto:**

Agite el envase, presione la tapa dosificadora en la señal PRESS para abrir, impregnar un algodón con SCABISIN y aplicar cubriendo las zonas afectadas, lavadas y secadas previamente.

**ADVERTENCIAS:**

No utilice en animales para consumo humano. No utilizar SCABISIN® suspensión en hembras gestantes o lactando.

En caso de reacción alérgica local a la permetrina suspender su administración.

El consumo accidental de la suspensión en los animales que se aplique y los que se encuentren próximos, puede provocar toxicidad que se manifestará por salivación y vómito que requieren de tratamiento sintomático.

**PRESENTACION:**

Frasco con 100 ml.

Hecho en México por:

PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.

Lago Tangañica Núm. 18

Colonia Granada

11520, CDMX, México

Tel. 555 2623100

Lada sin costo 800 907 49 00

Mayor información

Soporte Médico Veterinario

[gervet@chinoin.com.mx](mailto:gervet@chinoin.com.mx)

[www.chinoin.com](http://www.chinoin.com)