

Vedifloxacina 10%

Reg. SAGARPA Q-0088- 018



Solución Inyectable
Antimicrobiano de amplio espectro y alta distribución

FÓRMULA:

Cada mL contiene
Enrofloxacin 100 mg
Vehículo cbp 1 mL

USO EN: Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos,
Equinos, Caninos y Felinos.

CARACTERÍSTICAS: Es un antimicrobiano de amplio espectro y rápida acción bactericida que inhibe a la girasa de DNA (topoisomerasa II) y evitan la duplicación bacteriana; la respiración y la división celular se detienen, interrumpiéndose los procesos celulares y alterando la integridad de la membrana.

INDICACIONES: Está indicada para infecciones digestivas como: Salmonelosis, Colibacilosis; infecciones respiratorias: Pasteurelosis, Neumonías; infecciones del aparato genitourinario: Metritis, Endometritis, Retención placentaria, Cervicitis; Infección de la glándula mamaria: Mastitis; Infecciones Purulentas: Gabarro y Abscesos e Infecciones Septicémicas; patologías causadas por las siguientes bacterias: *Mycoplasmas spp*, *Actinobacillus spp*, *Bacteroides spp*, *Fusobacterium spp*, *Corynebacterium spp*, *Listeria, spp*, *Staphylococcus spp*, *Campylobacter spp*, *E. coli*, *Pasteurella spp*, *Salmonella spp*, *Pseudomonas spp* y *Enterococcus spp*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.

DOSIS:

Especie	Dosis mL/Kg
Bovinos, Ovinos y Caprinos	1 a 2 mL / 40 Kg cada 24 h durante 3 a 5 días.
Equinos	1 a 2 mL / 40 Kg cada 24 h
Porcinos	1 mL / 40 Kg cada 24 h durante 10 días.
Caninos y Felinos	0.25 a 0.5 mL / 10 Kg cada 12 h

ADVERTENCIAS: No usar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano, ni industrializar la leche de los animales tratados con este producto hasta 5 días después del último tratamiento. No administrar a caninos menores de 1 año. En cerdos no aplicar más de 2.5 mL por sitio de aplicación. Manténgase en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol. No dejar al alcance de los niños ni de animales domésticos.

PRESENTACIÓN:

- Frasco de 50 mL.
- Frasco de 100 mL.
- Frasco de 250 mL.