

# Vedigen G/P

Reg. SAGARPA Q-0088-072



Solución inyectable  
**Antibiótico de amplio espectro y alta concentración**

## FÓRMULA:

Cada mL contiene  
Sulfato de Gentamicina 100 mg  
Vehículo cbp 1 mL

**USO EN:** Bovinos, Equinos y Porcinos.

**CARACTERÍSTICAS:** Es una solución inyectable de Gentamicina, antibiótico del grupo de los aminoglucósidos el cual posee buena distribución tisular y acción bactericida que actúa sobre bacterias gramnegativas susceptibles, aunque también actúa contra algunas grampositivas.

**INDICACIONES:** Es útil en el tratamiento de colibacilosis, disentería porcina, enteritis necrótica, salmonelosis, neumonías, diarrea, septicemia, metritis, endometritis, cervicitis y otras infecciones provocadas por gérmenes gramnegativos y grampositivos susceptibles. Actúa contra: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *S. faecalis*, *Dyplococcus pneumoniae*, *Enterobacter aerogenes*, *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp*, *Shigella spp*, *Pseudomona aeruginosa*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus influenzae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycobacterium tuberculosis*.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular, intravenosa, subcutánea e intrauterina.

## DOSIS:

Especie	Dosis mL/Kg
Bovinos	2.2-3.3mL / 50 Kg / 24 h
Equinos	3.3 mL / 50 Kg / 24 h
Porcinos	1.5 mL / 30 Kg / 24 h

## Para cervicitis, metritis y endometritis:

**Vacas:** 20 a 25 mL por cada 200 a 500 mL de solución salina (vía intrauterina) por 3 a 5 días durante el período de estro.

**Cerdas:** de 2 a 10 mL en 16 a 80 mL de solución salina fisiológica (vía intrauterina) durante 3 a 5 días.

**ADVERTENCIAS:** No usar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano. Manténgase en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol. No dejar al alcance de los niños ni de animales domésticos.

## PRESENTACIÓN:

- Frasco de 100 mL.
- Frasco de 250 mL.