

VERMI-HORSE®

Reg. Q-0895-062

**GEL ORAL
COMBINACIÓN DE ANTIPARASITARIOS
ORALES DE AMPLIO ESPECTRO PARA
CABALLOS VITAMINADO.**



FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

Ivermectina.....	1.20 g
Praziquantel.....	6.00 g
Vitamina B12.....	0.00042 g
Vehículo c.b.p.....	100 g

USO EN:

Caballos y burros.

DESCRIPCIÓN:

La pasta **Vermi-Horse®** es un antihelmíntico de amplio espectro, complementado con vitamina B12. La Ivermectina y Praziquantel son antiparasitarios ampliamente estudiados, mostrando ser excelentes en el control y tratamiento de las enfermedades parasitarias de los Equinos. **El mecanismo de acción de la Ivermectina** se manifiesta directamente sobre el sistema nervioso de los nematodos uniéndose a los canales aniónicos glutamados del calcio, del ácido gama amino butírico (GABA) que están presentes en los nervios y en las células musculares de los invertebrados, causando parálisis muscular de la faringe y muerte de los parásitos por asfixia e inanición. La Ivermectina sinergiza al GABA estimulando la conductancia del GABA, es decir estimula inhibe el sistema de actividades funcionales no vitales, teniendo amplio espectro endoparasitocida paralizando nematodos. **El mecanismo de acción de Praziquantel** consiste en un aumento de permeabilidad de la membrana celular al ión calcio, lo que lleva a una concentración de calcio en el músculo muy marcada, manifestándose en una parálisis muscular espástica, además de la vacuolización y desintegración del tegumento (envoltura parasitaria) dejando inerte al parásito. **La vitamina B12 (cianocobalamina)** ayuda en la formación de glóbulos rojos (eritropoyesis), actividad necesaria en la anemia provocada por los nematodos al alimentarse y destruir la mucosa intestinal y causar hemorragias. Además, la vitamina B12 es también un estimulante natural del apetito.

INDICACIONES:

La pasta **Vermi-Horse®** está indicada para combatir y controlar las infestaciones producidas por parásitos del tracto gastrointestinal y respiratorio de los equinos, notándose una marcada efectividad contra:

Estróngilos mayores: *Triodontophorus brevicauda*; *Triodontophorus serratus*; *Craterostomum aeuticaudatum*; *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Strongylus edentatus*.

Estróngilos menores: *Cyathostomum spp*; *Cyclostephanus spp*; *Cyclocyclus spp*; *Cyclodontophorus spp*; *Petrovinema spp*; *Posteriosomum spp*; *Coronocylus spp*; *Trichonema spp*.

Ascáridios: *Parascaris equorum*.

Dipteros: *Habronema muscae*; *Habronema majus*; *Draschia megastoma*; *Gasterophilus nasalis*; *Gasterophilus intestinalis*.

Oxiuridos: *Oxyuris equi*.

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus arnfield*; *Parascaris equorum* larva.

Trichostrongiloides: *Trichostrongylus* spp.

Parasitos filariales: *Onchocerca cervicalis* (microfilaria)

Otros nemátodos internos como: *Strongyloides westeri* y

Céstodos: *Anoplocephala* spp., *Paranoplocephala mamillana*, *Paranoplocephala perfoliata*. Larvas de mosca.

REACCIONES SECUNDARIAS:

Los signos que pueden presentarse por sobredosis de Prazicuantel son: trastornos gastrointestinales, en menor grado, cefalea, fiebre, debilidad, salpullido, prurito y ataxia. En el caso de la ivermectina y solo en escasas ocasiones se puede presentar ataxia, bradipnea, parpados caídos, disminución de la actividad, temblores, midriasis. Estas alteraciones solo se presentarán al dar hasta 5 veces más la dosis terapéutica recomendada.

DOSIS PREPONDERAL:


El contenido completo de una jeringa para 600 kg de peso o girar la rosca sobre el émbolo de acuerdo al peso del animal hasta la marca de los 100, 200, 400, 500 kg de peso, para un buen control parasitario se recomienda la utilización de **Vermi-Horse®** cada 3 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

 Oral

INSTRUCCIONES PARA SU DOSIFICACIÓN Y USO:

- Quite el tapón de la jeringa **(1)**.
- Gire la rosca del émbolo **(2)**.
- Hasta colocarla sobre el número que indica la cantidad de kilogramos que se estima pesa el caballo **(3)**.
- Administrarse el contenido.
- Para caballos de 600 kilogramos de peso vivo, administrar el contenido total de la jeringa.
- Introduzca la jeringa en el hocico del caballo colocando la punta sobre el dorso de la base de la lengua o bien entre los molares y los carrillos de mismo.
- Oprima el émbolo.
- Antes de aplicar el producto es importante asegurarse de que el animal no contenga residuos voluminosos de alimento en el hocico ya que estos le permiten expulsar la pasta.



ADVERT

Mantenga almacenado y maneje el producto fuera del alcance de los niños.
"No administrar este producto a equinos destinados para consumo humano"

PRESENTACIÓN: Una jeringa con 10 g de **Vermi-Horse®** gel. Para el tratamiento y control de las enfermedades parasitarias de su caballo y burro.

**Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica**

Hecho en México por:
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V.
Lago Tangañica Núm. 18
Colonia Granada
11520, CDMX, México
Tel. 55 52623100
Lada sin costo 800 907 49 00
Mayor información
Soporte Médico Veterinario
gervet@chinoin.com
www.chinoin.com